villages nôont signal® des infections du ver de Guin®e que lors dôune seule ann®e. Vingt-neuf emplacements ont notifié une infection chacun pendant cette période. La ville de Djenné a notifié 7 infections et Massoen a notifié 5 alors que Mampe, Sokoura, Gueda et Kolongotomo Bozo ont notifié chacun 3 infections. La distribution des emplacements avec des infections par district est la suivante : district de Tominian/Région de Ségou (19), Djenné/Région de Mopti (15), Macina/Ségou (4), Markala/Ségou (2), Baroueli/Ségou (1). Cette incidence ramifiée et dispersée de lôinfection du ver de Guin®e au Mali ces derni¯res ann®es est diff®rente de lôexp®rience pr®c®dente du Mali. Elle ressemble à présent au mode tchadien mais en moins intense. Des analyses génétiques détaillées des vers au Mali sont en train dô°tre r®alis®es.

Tableau 2

DRACUNCULOSE DU MALI

41 emplacements notifiant les infections du ver de Guinée de 2016 - août 2021

Village #	Nom du village	District sanitaire	District	Region	Année et nombre de cas					
					2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
1	Dimana	Fangasso	Tominian	Segou	1					
2	Masso	Fangasso	Tominian	Segou	2		1	2		
3	Mampe	Fangasso	Tominian	Segou	1	1	1			
4	Bathiridougou	Ouan	Tominian	Segou	2					
5	Kantama	Ouan	Tominian	Segou	1	1				
6	Bosokuy	Ouan	Tominian	Segou	1					
7	Parasilame	Fangasso	Tominian	Segou	1	1				
8	Tesso	Fangasso	Tominian	Segou	1					
9	Sokoura	Fangasso	Tominian	Segou	1		1	1		
10	Toubaro	Koula	Tominian	Segou		1				
11	Tako	Konio	Djenne	Mopti		1				
12	Konofia	Djenne	Djenne	Mopti		1				
13	Douguel	Ouan	Tominian	Segou		1				
14	Tolober	Djenne	Djenne	Mopti		1				
15	Kanafa	Djenne	Djenne	Mopti		1				

[( )] TJ ET Q Q EMC q 317.206463.51 [redacted] 551G [([( )] TJ ET Q Q > BDC q 317.45 463.51 45.384 11.51 9.96 Tf 1 0 0/F1 9.9

TCHAD

Le Tchad continue à diminuer le nombre de chiens avec des infections du ver de Guinée : à titre provisoire, 58% d'infections en moins en janvier-juillet 2021 (518) comparé à la même période en 2020 (1229) (Figure 2). Le Tchad a également réduit le nombre de cas humains de dracunculose de l'ordre de 64% : de 11 cas à 4 cas et le nombre de chats infectés de l'ordre de 55% : de 40 à 18 pendant la même période. Ces réductions analogues dans les infections en réponse aux interventions mises en œuvre en 2020 peuvent suggérer une modalité partagée de transmission parmi les espèces d'hôtes définitifs au Tchad. Les taux d'endiguement (confinement ou isolement) parmi les humains, chiens et chats infectés par le ver de Guinée de janvier à juillet 2021 sont de 100%, 81% et 86%.

Figure 2



* Provisoire

La surveillance des infections par le ver d… …améliorer tel qu'on peut le noter au niveau des rumeurs plus nombre… …eindre de ces rumeurs menant à des cas confirmés (Figure 3). Plus de 40 000 rume… …à juin 2021 (1% d'infections confirmées du VG) contre presque 82 000 ru… …ées de janvier à juin 2020. Sur les quatre cas humains confirmés en 2021…

LôAngola continue, ¨ bon pas, dô®tendre et de renforcer la surveillance ¨ base communautaire (SBC) ¨ Cunene qui est la seule province en Angola o½la transmission autochtone de la dracunculose a ®t®confirm®e. LôAngola a notifi®z®ro cas humain et z®ro animal infect®jusquô¨ pr®sent en 2021.

En ao¾t 2021,

- Le programme a visit®13 villages ¨ risque et groupements dans deux municipalit®s dôend®micit® (Cuanhama et Namacunde) ï plus de 780 personnes ont ®t®sensibilis®s au programme de r®compenses et ¨ la pr®vention de lôinfection VG.
- 5 ®tablissements de sant®ont re-u une supervision directe.
- 3 rumeurs ont ®t®not®es et investigu®es (100%) dans les 24 heures dans la municipalit®de Namacunde, Cunene ; aucune ne sôest av®r®°tre un ver de Guin®e.
- 2 visites de surveillance et de suivi ont ®t®faites pour les cas humains de 2020 et lôinfection animale de 2019.
- 3 autres points dôeau insalubre ont ®t®cartographi®s et pratiquement 100 familles ont re-u des filtres de coton.

La surveillance de la dracunculose est ®galement ®largie et renforc®e dans trois provinces ï Huila, Namibe et Cuando Cubango dans le voisinage de Cunene. Cent soixante-quinze (175) professionnels de la sant®et agents de sant®communautaire ont ®t®identifi®s de 24 communes dans les 3 provinces aux confins de Cunene.

Pendant la p®riode allant dôavril ¨ ao¾t 2021, les recherches pour les cas humains de dracunculose et les infections animales du ver de Guin®e ont ®t®int®gr®es ¨ dôautres activit®s de terrain en sant®publique comme lô®valuation interfrontali¯re Angola-R®publique d®mocratique du Congo de la l¯pre, lôulc¯re de Buruli, le pian et la trypanosomiase humaine ; les enqu°tes de 2021 sur les connaissances, attitudes et pratiques en mati¯re de paludisme ; et lô®valuation de lôimpact du d®parasitage. Les rapports pr®liminaires indiquent que 88 rumeurs de cas humains ont ®t®notifi®es dans les zones visit®es : U²ge, Za²re, Huambo, Cunene et Cuando Cubango. Ces rumeurs viennent sôajouter aux 17 rumeurs notifi®es et enqu°t®es en Angola de janvier ¨ ao¾t 2021. Aucune de ces rumeurs nôa ®t®confirm®e pour le moment comme ®tant le ver de Guin®e.

U²geur 8 2 de la ab on[re Ž e 2 omme ®o

Tableau 3

Nombre de cas de dracunculose confirmés en laboratoire et nombre de cas notifiés et endigués par mois en 2021*
(Pays disposés en ordre de cas décroissants en 2021)

Pays avec transmission du ver de Guinée	Nombre de cas endigués/Nombre de cas notifiés													% CONT.
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL*	
TCHAD^	0 / 0	1 / 1	1 / 1	1 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	/	/	/	3 / 4	75%
ETHIOPIE	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	/	/	/	1 / 1	100%
		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	/	/	/	/	2 / 2	100%